



Karta Specjalnych Ostrzeżeń dla pacjenta przyjmującego lek ORENCIA*

Niniejsza Karta Specjalnych Ostrzeżeń zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z których należy zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia lekiem ORENCIA.

- Niniejszą kartę należy okazywać każdemu lekarzowi prowadzącemu leczenie.

Zakażenia

ORENCIA zwiększa ryzyko zakażeń.

- Jeśli u pacjenta wystąpi ciężkie zakażenie, nie może być leczony lekiem ORENCIA.
- Przed rozpoczęciem leczenia lekiem ORENCIA, pacjent powinien być zbadany, czy nie występują u niego pewne zakażenia

Gruźlica: Pacjent powinien być przebadany w kierunku gruźlicy przed leczeniem lekiem ORENCIA. Jest bardzo ważne, aby poinformować lekarza o przebytej gruźlicy lub bliskim kontakcie z osobą chorą na gruźlicę.

Zapalenie wątroby: Leczenie przeciwreumatyczne może być związane z nawrotem zapalenia wątroby typu B. Pacjent powinien być przebadany w kierunku wirusowego zapalenia wątroby zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Zakażenia

- Jeśli pojawią się objawy sugerujące zakażenia, takie jak: gorączka, utrzymujący się kaszel, zmniejszenie masy ciała lub apatia należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Reakcje alergiczne

Po zastosowaniu produktu ORENCIA mogą wystąpić reakcje alergiczne. Jeśli wystąpią objawy, takie jak ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, poważne zawroty głowy lub uczucie poprzedzające omdlenie, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Daty leczenia lekiem ORENCIA:

Rozpoczęcie: _____

Ostatnie podanie: _____

- Aby uzyskać więcej informacji należy przeczytać ulotkę leku ORENCIA.
- Udając się do lekarza należy zawsze mieć ze sobą listę wszystkich przyjmowanych leków.

Nazwisko pacjenta: _____

Nazwisko lekarza: _____

Telefon lekarza: _____

Kartę należy zachować przez 3 miesiące od daty przyjęcia ostatniej dawki leku ORENCIA, ponieważ działania niepożądane mogą wystąpić przez długi okres po przyjęciu ostatniej dawki leku ORENCIA.

Nie należy stosować leku ORENCIA u kobiet w ciąży, chyba że jest to konieczne. Jeżeli pacjentka otrzymała lek ORENCIA w okresie ciąży, ważne jest, aby przed podaniem jakichkolwiek szczepień dziecku, poinformować o tym pracowników opieki zdrowotnej zajmujących się dziećmi. W okresie 14 tygodni od ostatniego podania leku ORENCIA u dziecka może wystąpić ciężka infekcja spowodowana „żywymi szczepionkami”.

* ORENCIA jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bristol-Myers Squibb Company

marzec 2026